

Naloxon "B. Braun" injektionsvæske 0,4 mg/ml		naloxon	V03
Virkning	Specifik antidot til opioider		
Indikation	Overdosering med opioider og partielle opioidagonister.(buprenorfin)		
Terapeutisk dosis	<p>Moderat overdosering i terapeutisk øjemed: 0,04 mg (0,1 ml) i.v. i refrakte doser hvert 3.-5. minut til sufficient respiration¹.</p> <p>Regulær forgiftning – f.eks. overdosering af narkotika: 0,4 mg (1 ml) i.v. kan gentages hvert 5. minut til sufficient respiration.</p> <p>Ved forgiftning med buprenorphin er der ofte behov for højere initialdosis (1,2 -2,0 mg (3 – 5 ml) i.v.</p> <p>Ved kortvarig effekt af injektion kan behandlingen ændres til infusion af 2 mg i 500 ml infusionsvæske.</p>		
Tilberedning Indgivelse	<p>Injektion: i.v.</p> <p>Infusion: 2 mg = 5 ml Naloxon injektionsvæske i 500 ml infusionsvæske. Infusionshastighed: individuel efter respons.</p>		
Bivirkninger	Tremor, ildebefindende, opkastning.		
Forsigtighedsregler	<p>Vær opmærksom på, at effekten af Naloxon kan ophøre før effekten af opioid med tilbagefald til følge.</p> <p>Kronisk morfinisme er relativ kontraindikation, medmindre der foreligger livstruende forgiftning.</p> <p>Ved indgift til narkomaner påvirket af opioider kan indgift af Naloxon hos enkelte medføre kraftige abstinenssymptomer. Svær hypertension, hjertearytmier, lungeødem og hjertestop er beskrevet.</p>		
Interaktion	-		
Holdbarhed	Kan opbevares 24 timer efter blanding med infusionsvæsken ved 2 – 8 ⁰ C		
Yderligere oplysninger	Naloxon kan blandes med Natriumklorid 9 mg/ml og Glukose 50 mg/ml.		

1. Kilde: Tværgående instruks for SLB. Behandling med antidoter under transport. Dokument: 44817 version 1.

Godkendt af	Overlæge Christian Gerlif, Anæstesiologisk afdeling, Kolding Sygehus	Dato 2. november 2010
--------------------	---	------------------------------