

<b>Fucidin</b> <b>Pul.sol.t.konc. til inf.</b>		Fusidin	J01
<b>Virkning</b>	Smalspektret antibiotikum med virkning fortrinsvis på stafylokokker. Anvendes sammen med andre stafylococ-stoffer til behandling af svære stafylococ-infektioner som osteomyelitis, diskitis etc. Bør kun anvendes parenteralt hvor peroral tilførsel ikke er mulig.		
<b>Indikation</b>	Alvorlige infektioner forårsaget af fusidinfølsomme bakterier		
<b>Terapeutisk dosis</b>	500 mg i.v.3-4 gange i døgnet		
<b>Tilberedning</b> <b>Indgivelse</b>	Pulveret opløses i medfølgende solvens og fortyndes herefter til 250-500 ml med isot.natriumklorid inf.væske eller isot.glukose inf.væske  Infusionen gives langsomt over ca.2 timer i en velperfunderet vene eller via centralt venekateter for at minimere risikoen for venespasmer og tromboflebit.		
<b>Bivirkninger</b>	Flebitis, tromboflebitis, kvalme,opkastning, diarre. Allergiske reaktioner m.fl. se Medicin.dk		
<b>Kontraindikation</b>	Allergi overfor indholdsstoffer		
<b>Interaktion</b>	Orale antikoagulantia, statiner, HIV-proteasehæmmere,		
<b>Holdbarhed</b>	24 timer		
<b>Yderligere oplysninger</b>	Bør kun anvendes iv. i tilfælde, hvor peroral tilførsel er umulig Må ikke blandes med andre infusionsvæsker og farmaka		
<b>Godkendt af</b>	<b>Læge: Axel Møller</b>		